


## 抗がん剤投与時の 下痢止め(ロペラミド)の飲み方

1日3回以上の下痢が始まった場合は、ロペラミド2カプセルの内服を開始してください。


2時間たっても下痢が止まらないときは、さらに1~2カプセル飲んでください。  
それでも下痢が止まらないといは2時間毎に1~2カプセルずつ飲み続けてください。  
1日最大16カプセルまで服用できますが、なるべく早めに受診して下さい。



## 抗がん剤投与時の 下痢止め(ロペラミド)の飲み方

1日3回以上の下痢が始まった場合は、ロペラミド2カプセルの内服を開始してください。

2時間たっても下痢が止まらないときは、さらに1~2カプセル飲んでください。  
それでも下痢が止まらないといは2時間毎に1~2カプセルずつ飲み続けてください。  
1日最大16カプセルまで服用できますが、なるべく早めに受診して下さい。



副作用症状がひどい時、そのほかにも何かいつもと違う症状に気づいた時には、遠慮なく病院にご連絡下さい。

夜間や土日・祝日は救急外来にて対応します。

高知県立幡多けんみん病院(代表) TEL 0880-66-2222

副作用症状がひどい時、そのほかにも何かいつもと違う症状に気づいた時には、遠慮なく病院にご連絡下さい。

夜間や土日・祝日は救急外来にて対応します。

高知県立幡多けんみん病院(代表) TEL 0880-66-2222