

採集地点 採水時間	水深	水温	塩分	溶存酸素	採水水深 (m)	コクロディニウム ポリクリコイデス	ミリオネクター ルブラ
	(m)	(°C)	(psu)	(mg/l)		(細胞/ml)	
立石 (別図⑫) 採水時間 9:47 透明度 16.8 m	0.0 5.0 10.0	28.4 28.3 28.3	33.1 33.5 33.6	5.8 5.9 5.9	7	0	0
栄喜奥 (別図②) 採水時間 9:54 透明度 11.5 m	0.0 5.0 10.0	28.4 28.3 28.3	32.5 33.6 33.6	5.7 5.4 5.6	8	0	0
青瀬山 (別図③) 採水時間 10:03 透明度 10.0 m	0.0 5.0 10.0	27.9 28.4 28.2	31.2 33.6 33.6	5.9 5.7 5.4	10	0	0
一切田 (別図⑪) 採水時間 10:05 透明度 15.0 m	0.0 5.0 10.0	28.7 28.3 28.2	32.7 33.6 33.6	5.5 5.8 5.8	10	0	0
弘浦② (別図①) 採水時間 10:15 透明度 12.5 m	0.0 5.0 10.0	28.0 28.3 28.2	31.2 33.6 33.6	5.4 5.8 5.6	10	0	0

「赤潮・貝毒プランクトンの調査について」は当所ホームページ内の
「宿毛湾赤潮情報」(URL: <http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/040406/akasio.html>)においてもご覧いただけます。