

採集地点 採水時間	水深	水温	塩分	溶存酸素	採水水深	コクロディニウム ポリクリコイデス
	(m)	(℃)	(psu)	(mg/l)	(m)	(細胞/ml)
立石 (別図⑫)	0.0	14.3	17.9	9.2		
採水時間 10:11	5.0	16.3	34.4	8.5	10	0
透明度 12.7 m	10.0	16.3	34.4	8.7		
栄喜奥 (別図②)	0.0	13.5	24.9	8.9		
採水時間 10:20	5.0	16.3	34.4	8.6	10	0
透明度 9.0 m	10.0	16.4	34.4	8.8		
青瀬山 (別図③)	0.0	16.1	33.9	8.2		
採水時間 10:27	5.0	16.4	34.4	8.6	10	0
透明度 9.0 m	10.0	16.4	34.4	8.9		
一切田 (別図⑪)	0.0	15.4	33.7	8.3		
採水時間 10:36	5.0	16.3	34.4	8.7	10	0
透明度 9.9 m	10.0	16.3	34.4	8.9		
弘浦② (別図①)	0.0	16.1	34.2	8.2		
採水時間 10:50	5.0	16.4	34.4	8.5	10	0
透明度 10.5 m	10.0	16.4	34.5	8.6		

「赤潮・貝毒プランクトンの調査について」は当所ホームページ内の
「宿毛湾赤潮情報」(URL: <http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/040406/akasio.html>)においてもご覧いただけます。