

採集地点 採水時間	水深		水温	塩分	溶存酸素	コクロディニウム ポリクリコイデス	ヘテロシグマ アカシオ
	(m)		(°C)	(psu)	(mg/l)	(細胞/ml)	
立石 (別図⑫) 採水時間 10:25 透明度 10.8 m	クロロフィル極大層	10	19.3	34.3	7.7	0	0
		0	21.1	22.2	9.1	0	3,300
		5	19.8	34.2	7.7	0	0
		10	19.3	34.3	7.7	0	0
栄喜奥 (別図②) 採水時間 10:38 透明度 4.0 m	クロロフィル極大層	4	19.9	34.1	8.0	0	1,800
		0	21.7	26.2	8.7	0	8,200
		5	19.8	34.1	8.0	0	2,200
		10	19.6	34.2	7.6	0	0
青瀬山 (別図③) 採水時間 10:52 透明度 3.7 m	クロロフィル極大層	5	19.8	34.2	7.9	0	0
		0	21.3	11.0	9.3	0	0
		5	19.8	34.2	7.9	0	0
		10	19.5	34.3	7.3	0	0
一切田 (別図⑪) 採水時間 11:01 透明度 4.8 m	クロロフィル極大層	2	20.2	34.0	8.7	0	3,650
		0	21.0	33.2	9.0	0	2,100
		5	19.8	34.2	7.8	0	450
		10	19.3	34.3	7.7	0	0
弘浦② (別図①) 採水時間 11:17 透明度 7.5 m	クロロフィル極大層	5	19.7	34.2	7.6	0	3,950
		0	21.5	17.6	9.3	0	3,950
		5	19.7	34.2	7.6	0	0
		10	19.5	34.2	7.4	0	0

「赤潮・貝毒プランクトンの調査について」は当所ホームページ内の
「宿毛湾赤潮情報」(URL: <http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/040406/akasio.html>)においてもご覧いただけます。