

採集地点 採水時間	水深	水温	塩分	溶存酸素	採水水深	コクロディニウム ポリクリコイデス
	(m)	(℃)	(psu)	(mg/l)	(m)	(細胞/ml)
立石 (別図⑫)	0.0	18.9	34.1	6.1	8	0
採水時間 10:01	5.0	18.9	34.1	6.2		
透明度 8.2 m	10.0	19.0	34.2	6.2		
栄喜奥 (別図②)	0.0	18.4	34.0	6.2	5	0
採水時間 10:09	5.0	18.5	34.0	6.4		
透明度 7.5 m	10.0	18.5	34.0	6.4		
青瀬山 (別図③)	0.0	18.4	33.7	6.0	7	0
採水時間 10:16	5.0	19.1	34.2	6.2		
透明度 6.7 m	10.0	19.0	34.2	6.4		
一切田 (別図⑪)	0.0	18.7	34.0	6.2	10	0
採水時間 10:23	5.0	18.8	34.1	6.2		
透明度 7.3 m	10.0	19.0	34.2	6.2		
弘浦② (別図①)	0.0	19.2	34.2	6.2	10	0
採水時間 10:34	5.0	19.2	34.2	6.3		
透明度 8.9 m	10.0	19.2	34.2	6.2		

「赤潮・貝毒プランクトンの調査について」は当所ホームページ内の
「宿毛湾赤潮情報」(URL: <http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/040406/akasio.html>)においてもご覧いただけます。