

採集地点 採水時間	水深	水温	塩分	溶存酸素	採水水深 (m)	コクロディニウム ポリクリコイデス	ギムノディニウム カテナータム
	(m)	(℃)	(psu)	(mg/l)		(細胞/ml)	
<b>立石 (別図⑫)</b> 採水時間 10:01 透明度 9.5 m	0.0	24.0	31.2	6.7	5	0	0
	5.0	23.8	34.0	6.7			
	10.0	23.8	34.0	6.6			
<b>栄喜奥 (別図②)</b> 採水時間 10:10 透明度 5.5 m	0.0	23.3	31.5	6.7	5	0	0
	5.0	23.9	34.0	6.6			
	10.0	23.6	34.0	6.6			
<b>青瀬山 (別図③)</b> 採水時間 10:15 透明度 7.0 m	0.0	23.9	33.2	6.5	7	8	0
	5.0	23.9	34.0	6.8			
	10.0	23.7	34.0	6.9			
<b>一切田 (別図⑪)</b> 採水時間 10:20 透明度 6.3 m	0.0	23.7	32.8	6.3	5	8	0
	5.0	23.9	34.0	7.0			
	10.0	23.8	34.0	7.1			
<b>弘浦② (別図①)</b> 採水時間 10:30 透明度 5.5 m	0.0	23.7	33.1	6.4	5	40	32
	5.0	23.6	34.0	6.5			
	10.0	23.6	34.0	6.3			

「赤潮・貝毒プランクトンの調査について」は当所ホームページ内の  
「宿毛湾赤潮情報」(URL: <http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/040406/akasio.html>)においてもご覧いただけます。