

採集地点 採水時間	水深	水温	塩分	溶存酸素	採水水深	コクロディニウム ポリクリコイデス
	(m)	(℃)	(psu)	(mg/l)	(m)	(細胞/ml)
立石 (別図⑫)	0.0	18.0	33.2	6.6		
採水時間 10:05	5.0	18.1	34.5	6.6	10	0
透明度 18.7 m	10.0	18.1	34.5	6.6		
栄喜奥 (別図②)	0.0	17.7	34.4	6.6		
採水時間 10:13	5.0	17.7	34.4	6.7	10	0
透明度 12.6 m	10.0	17.7	34.4	6.7		
青瀬山 (別図③)	0.0	16.6	33.7	6.8		
採水時間 10:20	5.0	18.0	34.4	6.6	10	0
透明度 17.0 m	10.0	17.7	34.4	6.6		
一切田 (別図⑪)	0.0	16.6	33.8	6.8		
採水時間 10:27	5.0	18.1	34.4	6.6	10	0
透明度 15.6 m	10.0	18.0	34.5	6.5		
弘浦② (別図①)	0.0	17.9	31.8	6.6		
採水時間 10:38	5.0	18.2	34.4	6.6	10	0
透明度 13.8 m	10.0	17.9	34.4	6.4		

「赤潮・貝毒プランクトンの調査について」は当所ホームページ内の
「宿毛湾赤潮情報」(URL: <http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/040406/akasio.html>)においてもご覧いただけます。